

---

## DEFINICIONES COBERTURAS DE VACUNACIÓN

---

Desde 2017 las coberturas de vacunación se calculan por cohortes de nacimiento, es decir, considerando el porcentaje de personas nacidas en un año determinado que habitan en el territorio evaluado en el momento de la evaluación, y que están vacunadas con una o varias dosis de determinada vacuna (independientemente del momento y el lugar en el que se vacunaron).

Las cohortes evaluadas cada año para cada indicador se especifican en el documento “Tablas cohortes”.

Las Comunidades Autónomas suministran la información sobre coberturas de vacunación a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, según acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Se utilizan diferentes tipos de fuentes de información para la obtención de los numeradores y los denominadores en las Comunidades Autónomas, lo cual implica limitaciones para la comparación y el cálculo de la cobertura total en España.

Los datos se solicitan dos veces cada año para evaluar las coberturas alcanzadas en el año anterior: en el primer y el tercer trimestre. Las coberturas obtenidas en el tercer trimestre se consideran definitivas, y cuando están disponibles sustituyen a las anteriores en la aplicación.

Para la obtención de todas las coberturas de vacunación mostradas en SIVAMIN se han utilizado las definiciones de indicadores propuestas por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y acordadas por la Comisión de Salud Pública en octubre de 2017, que se han ido actualizando a los cambios realizados en los programas de vacunación.

### DEFINICIONES UTILIZADAS

- Hexavalente, 2 dosis. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con al menos 2 dosis de vacuna frente a poliomielitis (VPI), difteria, tétanos y tosferina (DTPa), *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib), hepatitis B (HB).
- Hexavalente, recuerdo 1. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con al menos 3 dosis de vacuna frente a poliomielitis (VPI), difteria, tétanos y tosferina (DTPa), *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) y hepatitis B (HB).
- Difteria/Tétanos/Tosferina. Recuerdo 2. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con una dosis de vacuna frente a difteria, tétanos y tosferina de baja carga (dTpa).
- Difteria/Tétanos. Recuerdo 3. Porcentaje de adolescentes, de una cohorte determinada, que han recibido una dosis de vacuna frente a tétanos y difteria (Td).

- Meningococo C. Dosis 1. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna frente a enfermedad meningocócica por serogrupo C.
- Meningococo C. Recuerdo 1. Porcentaje de niños y niñas, de una corte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna frente a enfermedad meningocócica por serogrupo C después de los 12 meses de edad.
- Meningococo C. Recuerdo 2. Porcentaje de adolescentes, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna frente a enfermedad meningocócica por serogrupo C después de los 10 años de edad.
- Meningococo ACWY. Recuerdo 2. Porcentaje de adolescentes, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna frente a enfermedad meningocócica por serogrupos ACWY después de los 10 años de edad.
- Neumococo conjugada. 2 dosis. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 2 dosis de vacuna conjugada frente a neumococo (VCN).
- Neumococo conjugada. Recuerdo 1. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con al menos 3 dosis de vacuna frente a neumococo (VCN).
- Triple vírica. Dosis 1. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de TV después de los 12 meses de edad.
- Triple vírica. Dosis 2. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 2 dosis de TV después de los 12 meses de edad
- Varicela. Dosis 1. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna frente a varicela (VVZ).
- Varicela. Dosis 2. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna frente a varicela (VVZ).
- Varicela. Adolescentes. Porcentaje de adolescentes susceptibles, de una cohorte determinada, vacunados con 2 dosis de vacuna frente a varicela después de los 10 años de edad.
- Virus del papiloma humano (VPH). Dosis 1. Porcentaje de niñas, de una cohorte determinada, vacunadas con al menos 1 dosis de VPH.
- Virus del papiloma humano (VPH). Dosis 2. Porcentaje de niñas, de una cohorte determinada, vacunadas con al menos 2 dosis de VPH.
- Difteria/Tétanos/Tosferina. Embarazadas: porcentaje de embarazadas que han recibido 1 dosis de dTpa durante el año analizado.

- Gripe. >64 años. Porcentaje de personas mayores de 64 años que han recibido una dosis de vacuna frente a la gripe en la temporada estacional indicada.
- Gripe. >74 años. Porcentaje de personas mayores de 74 años que han recibido una dosis de vacuna frente a la gripe en la temporada estacional indicada.
- Gripe. 60-64 años. Porcentaje de personas de 60-64 años que han recibido una dosis de vacuna frente a la gripe en la temporada estacional indicada.
- Gripe. Embarazadas. Porcentaje de embarazadas que han recibido una dosis de vacuna frente a la gripe en la temporada estacional indicada.
- Gripe. Personal sanitario. Porcentaje de profesionales sanitarios que han recibido una dosis de vacuna frente a la gripe en la temporada estacional indicada.